

# May-Leonard の三種競争系

芝浦工業大学 数理科学研究会 BV19035 園田夏紀

令和元年 11月 1日

## 1 研究背景

ある日数理研の先輩に微分方程式はどこで使えるのか質問をしてその答えの1つとして Lotka-volterra の方程式があった。その内容にとっても興味を持ち、今回の研究テーマにしようと思った。また、May-Leonard の3種競争系は Lotka-volterra の方程式の応用であり、とても面白いものだと感じた。

## 2 連立微分方程式

未知数が複数個ある微分方程式を連立微分方程式という。平衡点とは、どのようなときに個体数が増えも減りもしない、つまり  $\frac{dx}{dt} = 0, \frac{dy}{dt} = 0$  を表す点のことである。アイソクライン (等傾斜線) とは、 $\frac{dx}{dt} = 0, \frac{dy}{dt} = 0$  を満たす直線を使って、 $x(t), y(t)$  がどのような振る舞いを起こしているか概略的に知ることができる。

## 3 2種 Lotka-Volterra 競争モデル

2つの種が共通の資源を求めて競争関係にある場合の最も単純なモデルとして、Lotka-Volterra の競争方程式

$$\begin{cases} \frac{dn_1}{dt} = (\epsilon_1 - \mu_{11}n_1 - \mu_{12}n_2)n_1 \\ \frac{dn_2}{dt} = (\epsilon_2 - \mu_{21}n_1 - \mu_{22}n_2)n_2 \end{cases}$$

がある。ここで、 $\epsilon_1, \epsilon_2$  を内的自然増加率、 $\mu_{11}, \mu_{22}$  を種内競争係数、 $\mu_{12}, \mu_{21}$  を種間競争係数 ( $\mu_{ij}$  は競争によって種  $j$  が種  $i$  の増殖率を減少させる効果) とする。

この式の解は陽に定まってないが、 $(n_1, n_2)$  平面にアイソクラインの方法にもとずいて描かれた相図から解の定性的な性質がわかる。ここでは  $\frac{\epsilon_1}{\mu_{11}} < \frac{\epsilon_2}{\mu_{21}}, \frac{\epsilon_2}{\mu_{22}} > \frac{\epsilon_1}{\mu_{12}}$  のときを考える。このとき、解は  $t \rightarrow \infty$  で平衡点  $(0, \frac{\epsilon_2}{\mu_{22}})$  に近づき、種2だけが生き残る。両者の種内競争係数の積が種間競争係数を上回る時 ( $\mu_{11}\mu_{22} > \mu_{12}\mu_{21}$ )、2種は共存できる。しかし、一般に2つの種が同じ場所で同じような生活様式をとっていると種間競争が激しくなるので種間競争係数が種内競争係数を上回る可能性が高い。実際、生態的に似た近縁の2種は同じ場所に共存することはできないという Gause の競争排他則が支持されている。

## 4 Lotka-Volterra の競争モデル (1 被食者-1 捕食者)

1 被食者-1 捕食者の関係を表す方程式として

$$\begin{cases} \frac{dn_1}{dt} = \epsilon_1 n_1 - \mu_{12} n_1 n_2 \\ \frac{dn_2}{dt} = \mu'_{12} n_1 n_2 - \mu_{22} n_2 \end{cases}$$

がある。ここで4つの係数  $\epsilon_1, \mu_{12}, \mu'_{12}, \mu_{22}$  は正の実数のパラメータである、被食者と捕食者の個体数変動パターンの一つの例

として、被食者が自然増殖して増えていくとそれを餌とする捕食者も増殖し、捕食者が増殖したことによって被食頻度が増えて被食者が減少し、被食者が減少したことによってそれを餌とする捕食者も減少し、捕食者が減少したことによって被食者の自然増殖数が被食頻度を上回って被食者が増え、そして最初に戻り、このような形で被食者と捕食者が交互に増減し続けることが考えられる。

## 5 May-Leonard の3種競争系

競争種が3種からなる Lotka-Volterra 系

$$\begin{cases} \frac{dn_1}{dt} = (\epsilon_1 - \mu_{11}n_1 - \mu_{12}n_2 - \mu_{13}n_3)n_1 \\ \frac{dn_2}{dt} = (\epsilon_2 - \mu_{22}n_2 - \mu_{23}n_3 - \mu_{21}n_1)n_2 \\ \frac{dn_3}{dt} = (\epsilon_3 - \mu_{33}n_3 - \mu_{31}n_1 - \mu_{32}n_2)n_3 \end{cases}$$

がある。以下、添え字  $i$  は3を法とする。上式の特別な場合として  $\epsilon_i = 1, \mu_{ii} = 1, \mu_{ii+1} = \alpha, \mu_{ii+2} = \beta, 0 < \beta < 1 < \alpha, \alpha + \beta > 2$  の場合を考える。この場合、種1より種2が強く、種2より種3が強く、種3より種1が強い。平衡点は  $E_0 = (0, 0, 0), E_1 = (1, 0, 0), E_2 = (0, 1, 0), E_3 = (0, 0, 1), E_* = (\frac{1}{1+\alpha+\beta}, \frac{1}{1+\alpha+\beta}, \frac{1}{1+\alpha+\beta})$  の5つである。  $0 < n_i \ll n_{i+1}, n_{i+2}$  のときの  $(n_{i+1}, n_{i+2})$  平面の中の軌道に注目する。この場合、パラメータの値は  $\frac{\epsilon_i}{\mu_{ii}} < \frac{\epsilon_{i+1}}{\mu_{i+1i}}, \frac{\epsilon_{i+1}}{\mu_{i+1i+1}} > \frac{\epsilon_i}{\mu_{ii+1}}$  を満たしており、 $n_{i+1} \leq 0, n_{i+2} > 0, 0 < n_i \ll n_{i+1}, n_{i+2}$  から出発した軌道は常に平衡点  $E_{i+2}$  に向かって近づいていく。

これは2種の Lotka-Volterra の方程式と違い境界上にある平衡点に近づいていくのではなく、 $E_0, E_*$  を除く平衡点の間をめぐるようにして変動する。

## 6 今後の課題

今回は May-Leonard の3種競争系の簡単な説明しか出来なかった。だから次までにこの完全な証明を理解したい。また、Lotka-volterra の方程式を今回は3種間に应用したが、次は  $n$  種間に应用したものを考えたい。

## 参考文献

[1] 甘利俊一, 重定南奈子, 石井一成, 太こ地武, 弓場美裕, 生命・生物科学の数理, 岩波書店, 1993.

[2] 堀畑和弘, 長谷川浩司, 常微分方程式の新しい教科書, 2016

[https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka-Volterra\\_equations](https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka-Volterra_equations)